

**הזרקה:** התמיסה שהתקבלה מוזרקת אל שכבת העור הדרמלית באמצעות מחט, במספר נקודות הפרושות על הפנים ו/או הגוף.

3

**1 אלחוש:** מריחת משחה מאלחשת

1

**ניקוי העור וסיום הפעולה:** בתום ההזרקה, יש לנקות את העור עם גזה ספוגה במי חמצן ולמרוח קרם הגנה או זלין.

4

**2 הכנת התכשיר:** ריקון האמפולה המכילה ג'ל חומצה היאלורונית אל תוך הבקבוקון המכיל חומצות אמינו. מנערים עד לקבלת תמיסה אחידה.

2

### פנים \ צוור

עור רפוי בפנים ובצוואר, סימני הזדקנות: JALUPRO

- טיפול כל 10 ימים, במשך 4 מפגשים, לפי המלצת הרופא.

קמטים במצח, קמטי ברקוד (מעל השפה העליונה), קמטי מרינטות, קמטים בצדי האף (נזולביאל), קמטים בצוואר: Jalupro HMW

- טיפול כל 20 ימים, במשך 3 מפגשים, לפי המלצת הרופא.

### גוף

רפיון בחלק הפנימי של היד, הירך, הברך והבטן, עור חסר לחות באזורים שונים בגוף: JALUPRO

- טיפול כל 10 ימים, במשך 4 מפגשים, לפי המלצת הרופא.

### צידי העיניים

1ml של חומצה היאלורונית מ-JALUPRO ואמפולה אחד של חומצות אמינו (0,5ml לכל צד).

- טיפול כל 10 ימים, במשך 3-4 מפגשים, לפי המלצת הרופא.

### קלואידים וצלקות

0,2-0,5ml של חומצה היאלורונית מ-JALUPRO ואמפולה אחד של חומצות אמינו

- טיפול כל 10 ימים, במשך 3-4 מפגשים, לפי המלצת הרופא.

### פילר (חומר מילוי)

- טיפול כל 10 ימים, במשך 3 מפגשים לפני הטיפול של מילוי.

### PRP - פלזמה עשירה בטסיות

- יש להוסיף אמפולה אחת של חומצות אמינו למבחנת PRP לאחר סרכוז.

או

- טיפול כל 10 ימים, במשך 5-6 מפגשים, של Jalupro ו-PRP לסירוגין (Jalupro → PRP → Jalupro → PRP...)

### לייזר ומיקרונדלינג (microneedling)

- Jalupro HMW ו- Jalupro בשילוב עם לייזר ומיקרונדלינג נותנים תוצאות יעילות ויציבות יותר.

## JALUBOTOX

פרוטוקול של ד"ר פיאובנו



\*ניתן להכפיל את מינון יחידות של הבוטוקס באזור הצוואר בלבד

**Jalupro**



15 ימים



**Jalupro**



15 ימים



**Jalubotox**



אין לחזור טיפול ב-JALUBOTOX בטרם חלפו 3 חודשים מהטיפול האחרון.

מומלץ לטפל באזורים הבאים:

**קמטים במצח (למעט הגלבלה), קמטים בצדי העיניים, קמטי "ברקוד", סנטר וצוואר**

יש למהול את הבוטולינים עם תמיסת סליין:

- 1 • Onabotulinum (Botox): מינון - 100U ב-1ml או 1,25ml  
 • Abobotulinum (Dysport): מינון - 300U ב-1,5ml או 500U ב-2,5ml

- 2 יש למהול את המוצר JALUPRO בהתאם להוראות (3ml של חומצה היאלורונית עם אבקת חומצות האמינו).

יש להשתמש בשני מזרקי Luer-Lock על מנת לערבב את ה-JALUPRO עם הטוקסין:

- 3 • יש לשאוב 1ml של Jalupro לתוך מזרק של 2,5ml  
 • 8-10U של Botox או 20-25U של Dysport במזרק של 1ml.  
 • חברו את שני המזרקים באמצעות קונקטור וערבבו.

- 4 הזריקו את הקוקטייל שהתקבל באמצעות הטכניקת מיקרו-פפולות אל שכבת הדרמיס עליונה. יש להזריק את אותה הכמות מימין ומשמאל על מנת להימנע מחוסר סימטריה.